

Pouxit

Solution pour
application cutanée

100%
EFFICACE*

Lire attentivement cette notice
avant toute utilisation

COOPER

● **COMPOSITION :**

Diméticone 4g.
Cyclométhicone 5 q.s.p. pour 100 g de solution.

● **INDICATION :**

POUXIT se présente sous forme d'une solution limpide et incolore en flacon de 100 ml.
Il est indiqué dans le traitement des poux du cuir chevelu (poux de la tête) et des lentes, chez l'adulte et l'enfant de plus de 6 mois.

POUXIT contient du diméticone (dérivé de la silicone) à 4 % et du cyclométhicone 5. Le cyclométhicone 5 agit comme un solvant volatil. Dès application sur le cuir chevelu, il s'évapore et laisse ainsi le diméticone tuer les poux et les lentes par action physique en les recouvrant.

POUXIT ne contient pas de substance au mode d'action neurotoxique sur le pou, il agit par effet physique.

● **MODE D'EMPLOI :**

Usage externe. Ne pas avaler. Ne pas appliquer sur peau lésée.

1) Appliquer la lotion sur le cuir chevelu et les cheveux secs.

2) Masser les cheveux afin d'obtenir une imprégnation complète de la chevelure.

3) Laisser sécher les cheveux naturellement à l'air (ne pas utiliser de sèche-cheveux).

4) Laisser agir le produit 1 heure.

En cas d'application le soir, il est possible de laisser agir **POUXIT** une nuit complète. Par mesure d'hygiène, vous pouvez appliquer une serviette sur l'oreiller.

5) Laver les cheveux avec un shampoing doux, puis rincer à l'eau.

Répéter impérativement le traitement après sept jours.

Si un membre de la famille a des poux, vérifier les autres membres de la famille et traiter les sujets atteints.

23379811

● MISES EN GARDE :

- Les enfants de moins de 6 mois doivent être traités **uniquement sous surveillance médicale**.
- Ne pas utiliser **POUXIT** en cas d'allergie à l'un des constituants du produit.
(voir composition).
- En cas d'irritation de la peau ou de tout autre signe d'hypersensibilité locale ou générale, arrêter le traitement, laver la peau avec de l'eau et du savon et demander un avis médical.
- Eviter tout contact avec les yeux. En cas de projection accidentelle dans l'oeil, rincer abondamment à l'eau claire. Si l'irritation persiste, consulter votre médecin.

- **Attention : la chevelure doit être tenue à l'écart de toute flamme, de cigarette ou toute source de chaleur intense pendant l'application de Pouxit et jusqu'au rinçage. Les cheveux imprégnés brûlent facilement si enflammés. Ne pas fumer.**

- Risque de glissade en cas de projection du produit sur une surface lisse.

TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

● GROSSESSE ET ALLAITEMENT :

La lotion **POUXIT** peut être utilisée pendant la grossesse et l'allaitement. D'une façon générale, il convient au cours de la grossesse et de l'allaitement de toujours demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien avant d'utiliser un produit.

● EFFETS INDESIRABLES

L'application de **POUXIT** peut s'accompagner d'une légère irritation. Parfois, une desquamation du cuir chevelu ainsi que des démangeaisons et irritations autour des yeux peuvent apparaître. Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

● CONSERVATION :

A conserver dans son emballage d'origine, à une température inférieure à 25° C.
Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte, le flacon.

Fabriqué par : Thornton & Ross Ireland Ltd.,
4045 Kingswood Road, Citywest Business Campus, Co.Dublin, Republic of Ireland.

Distribué par : COOPERATION PHARMACEUTIQUE FRANÇAISE
Place Lucien Auvert
77020 Melun Cedex, France
www.pouxit.fr



Juin 2010

23379811

* 100% d'efficacité pédiculicide ex-vivo.